

# ПАМЯТКА

## **первая помощь при отравлении угарным газом.**

**Угарный газ (окись углерода CO)** – продукт неполного сгорания органических веществ, высокотоксичный газ, без цвета и запаха. Приводит к острому кислородному голоданию.

Отравление может произойти при работе бензиновых двигателей, сгорании природного газа, при пожаре и т.д.

Чаще всего смерть наступает в результате отравления угарным газом в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

Отравление может быть постепенным или молниеносным. Это зависит от концентрации газа в воздухе, длительности его воздействия и индивидуальной чувствительности человека.

### **Признаки отравления:**

#### **а) при лёгкой степени**

- появление ощущения тяжести и пульсаций в голове;
- боль в области висков и лба («обруч на голове»), потемнение и мелькание «мушек» в глазах, шум в ушах;
- покраснение кожных покровов, сердцебиение, оглушённость, дрожь, слабость, тошнота, рвота.

#### **б) при более тяжёлой степени:**

- нарастающая мышечная слабость, учащение пульса, расширение зрачков, поверхностное дыхание, головокружение;
  - путаное сознание, сонливость, затем – потеря сознания;
  - непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря;
  - появление синюшности на лице, возможно – розовых пятен.
- При поверхностном дыхании, глухом сердцебиении, начале судорог возможна смерть.

### **Первая помощь пострадавшим:**

- вынести на свежий воздух и положить на спину горизонтально;
- при любой погоде – расстегнуть одежду и открыть грудную клетку;
- напоить горячим сладким чаем или кофе;
- охладить лицо и грудь (холодная вода, охлаждённая тряпка, лёд или снег);

### **Если пострадавший не приходит в себя:**

- любым способом вызвать раздражение в носу (пером, табаком, горчицей, перцем, нашатырным спиртом), т.е. заставить потерпевшего чихать;
- полезно проводить растирание груди до появления дыхания (варежкой, шарфом и другими предметами);
- провести искусственное дыхание;
- направить пострадавшего в лечебное учреждение.